

Agrosil 6 milhões

ANTIBIÓTICO INJETÁVEL
DE LARGO ESPECTRO

USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada frasco-ampola com pó contém:
Benzilpenicilina Procaína.....4.000.000 UI
Benzilpenicilina Potássica.....1.000.000 UI
Benzilpenicilina Benzatina.....1.000.000 UI
Estreptomicina (Sulfato).....2 g

Cada ampola com diluente contém:

Água para injetáveis.....15 ml

Indicações de uso:

Bovinos: Mastites (*Streptococcus* sp), Edema maligno (*Clostridium septicum*), Carbúnculo sintomático (*Clostridium chouvey*), Gangrena (*Clostridium perfringens*), Tétano (*Clostridium tetani*), Hemoglobinúria (*Clostridium haemolyticum*).

Equinos: Garrotilho (*Streptococcus equi*), Onfaloferbile (*Staphylococcus genitalium*), Artrite supurativa (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Actinobacillus* spp), Linfagite ulcerativa (*Clostridium pseudotuberculosis*), Pneumonia dos potros (*Corynebacterium equi*), Listeriose (*Listeria monocytogenes*), Septicemia dos potros (*Salmonella abortus equi*), etc.

Suínos: Enterite necrótica (*Clostridium perfringens*), Diarréia dos leitões (*Escherichia coli*), Meningite, Septicemia e Artrite (*Streptococcus suis*), Síndrome da Agalactia MMA (*Escherichia coli*, *Streptococcus* spp, *Klebsiella* spp), Erisipela (*Erysipelotrix rhusiopathiae*), Abcessos e infecções de ferimentos (*Staphylococcus* sp e *Streptococcus* spp), etc.

Ovinos: Artrite infecciosa dos cordeiros (*Streptococcus genitalium*), Poliartrite dos cordeiros (*Actinomyces pyogenes*, *Streptococcus faecalis*, *Fusibacterium necrophorus*), Endocardite (*Streptococcus pyogenes*), Linfadenite caseosa (*Corynebacterium pseudotuberculosis*, *Listeria monocytogenes*), Carbúnculo sintomático (*Clostridium chouvey*), Edema maligno (*Clostridium septicum*).

Posologia e modo de uso:

Bovinos, Equinos, Suínos, Ovinos

Aplicar 1 ml para cada 30 a 40 kg de peso ou um frasco para cada 600 a 800 kg de peso, diariamente durante 3 a 5 dias. O tratamento deve se prolongar por mais 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Em 1 ml de produto reconstituído temos 0,43 g de pó em suspensão, na seguinte proporção:

Benzilpenicilina Procaína: 200.000 UI

Benzilpenicilina Potássica: 50.000 UI

Benzilpenicilina Benzatina: 50.000 UI

Estreptomicina (Sulfato): 134 mg

Agrosil deve ser administrado por via intramuscular. Transferir para o frasco o conteúdo do diluente, com o auxílio de uma seringa, agitando bem, até obter uma suspensão homogênea.

OBS: Usar agulhas com diâmetro mínimo de 1 mm e tamanho de 25 a 30 mm.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Efeitos colaterais (locais e/ou gerais, incompatibilidade e antagonismos farmacológicos):

As penicilinas são substâncias de baixa toxicidade, mas com alto índice de sensibilização. As seguintes reações foram relatadas durante o uso das penicilinas: erupção cutânea, edema de glote, febre, artralgia e prostração. Reações anafiláticas têm sido relatadas. Em raras ocasiões podem ocorrer reações de hipersensibilidade às penicilinas e estreptomicinas. Ocorrendo estas reações deve-se imediatamente administrar medicação adequada, tal como Epinefrina e/ou anti-histamínicos.

Interações medicamentosas:

Com relação às penicilinas quando associadas ao Probenecide a excreção destas é sensivelmente diminuída, assim como são aumentados os níveis sanguíneos. Com relação à Estreptomicina, devido à

Benzilpenicilina Procaína
Benzilpenicilina Potássica
Benzilpenicilina Benzatina
Estreptomicina (Sulfato)

similaridade com outros antibióticos Aminoglicosídeos as interações medicamentosas mencionadas abaixo precisam ser consideradas durante seu uso: Deve ser evitado o uso seqüencial ou concomitante da Estreptomicina com outras drogas neurotóxicas ou nefrotóxicas tais como as cefalosporinas (especialmente a Cefaloridina), Polimixina B, Colistina, Vancomicina, Anfotericina B, diuréticos potentes tais como Ácido Etacrínico, Furosemida, Manitol, etc.

ATENÇÃO OBEDECER OS SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA.

BOVINOS E OVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ULTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

SUÍNOS: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ULTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDAS SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Modo de conservação:

O produto deve ser mantido na embalagem original até a completa utilização, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, umidade e calor, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Uma vez reconstituído, o produto deverá ser consumido no máximo 12 horas se conservado sob refrigeração (2 a 7°C).

Apresentação:

1 frasco-ampola contendo pó (Penicilinas+Estreptomicina) e um frasco-ampola contendo 15 ml de diluente (Água para injetáveis).

Validade do produto:

2 (dois) anos a partir da data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sob o nº: 8.898 em 30/06/2004.

Responsável Técnico: Dr. Alan Fioroni Kastein CRF-SP: 31640.

Proprietário e Fabricante:



Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.

Rua João Augusto Cirelli, nº 640, Distrito Industrial.

FONE: 55 (19) 3593-9999

CNPJ: 50.472.547/0001-68

Inscrição Estadual: 285.007.656.112

e-mail: vansil@vansil.com.br www.vansil.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA