

BIOTOX[®]

CARRAPATICIDA, SARNICIDA E PIOLHICIDA.

USO VETERINÁRIO PULVERIZAÇÃO E BANHO

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Amitraz 12,5g
Veículo q.s.p. 100mL

INDICAÇÕES:

Utilizado como carrapaticida e sarnicida para cães..

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Uso externo através de pulverização e banho:

Cães - No tratamento da sarna sarcóptica, diluir 10mL de **BIOTOX** em 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo o banho com 7 a 10 dias de intervalo. No tratamento da sarna demodéica diluir 10mL de **BIOTOX** em 2,5 litros de água, banhando o animal num total de 3 a 4 banhos, com intervalo semanal. No controle de carrapatos diluir 10mL de **BIOTOX** em 5 litros de água banhando uma vez e repetindo após 3 semanas se necessário. Aplicar a mistura no cão, friccionando bem o pelo com uma esponja ou pano (todo o corpo do animal deve ser molhado pela mistura, principalmente entre as pernas, cauda e cabeça) . O animal não deve ser enxaguado e deve ser seco à sombra para melhor eficácia do produto. Utilizar para a higienização do canil a sobra da solução utilizada no banho ou uma nova solução deve ser preparada nas mesmas proporções, deixando secar sem enxaguar.

PRECAUÇÕES:

Evitar o tratamento de animais cansados ou estressados antes e após o tratamento, bem como evitar o tratamento nas horas mais quentes do dia. Evitar o tratamento de fêmeas em estado adiantado de gestação, apesar de não se conhecer casos de aborto ou má formação (teratogênicos) de fetos. Ao operador evite o contato de **BIOTOX** com a pele, mãos, boca e olhos, lavando-os com sabão e água em abundância. Usar equipamentos de segurança (máscara, luvas, roupa protetora impermeável e botas). Não pulverizar contra o vento, bem como não utilizar pulverizadores manuais ou mecânicos com vazamentos. Em caso de ingestão acidental ou suspeita de intoxicação procurar imediatamente um médico. Não se conhece nenhum antídoto específico para o princípio ativo do **BIOTOX**, devendo-se fazer tratamento analéptico e sintomático tanto nos casos humanos como em animais. Sintomas como depressão do SNC e respiratória, queda de pressão sanguínea, distúrbios digestivos, cefaléia, agitação corporal, tremores e convulsões são causados por intoxicação pelo componente ativo do **BIOTOX**. Não utilizar as embalagens vazias para outros fins.

APRESENTAÇÕES:

Frasco contendo 40mL.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.424/96 em 26/01/1996.

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516

Venda sob prescrição e aplicação do Médico Veterinário

Proprietário:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 - Jaboticabal – SP



Fone/Fax: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

www.biofarm.com.br

SAT - Serviço de Atendimento Técnico

0800 702 3551