



## USO VETERINÁRIO

### Solução injetável a 1% a base de Doramectin



**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**  
**BOVINOS E OVINOS:**  
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.  
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÉMEAS DE BOVINOS E OVINOS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

**SUÍNOS:**  
O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIOS PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semi-confinamento e em regime extensivo na fase de terminação.

Conteúdo: 200 mL

PART:  
FABR.:  
VENC.:

zoetis



**Fórmula:**  
Cada 100 mL contém:  
Doramectin ..... 1,00 g  
Veículo ..... q.s.p. ..... 100,00 mL

**Indicações:** Dectomax® é indicado para o tratamento e controle dos parasitos internos e externos dos bovinos, suínos e ovinos. Informações detalhadas: vide bula.

**Dosagens e Restrições de Uso:** vide bula.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Responsável Técnico: Renato B. Ferreira - CRMV-SP nº 1.695  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4055/92 em 14/08/92.

Proprietário: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701 - CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ nº 43.588.045/0001-31

Fabricante: Inovat Indústria Farmacêutica Ltda

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.555

CEP 07112-070 - Guarulhos - SP

CNPJ nº 27.864.378/0001-90 - Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919

4015673

zoetis

## Dectomax®

USO VETERINÁRIO  
Solução Injetável a 1%  
Marca de Doramectin

Doramectin ..... 1,00 g  
Veículo ..... q.s.p. ..... 100,00 mL

### Indicações:

#### Bovinos:

Dectomax® é indicado para o tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, miases (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle da população da mosca-dos-chifres dos bovinos, conforme especificações a seguir:

#### Nematódeos gastrintestinais (adultos e larvas de quarto estágio):

- *Ostertagia ostertagi* (inclusive larvas inibidas)
  - *Haemonchus spp*
  - *Haemonchus contortus\**
  - *Haemonchus similis\**
  - *Trichostrongylus axei*
  - *Trichostrongylus longispiricularis\**
  - *Trichostrongylus colubriformis\**
- \* (adultos)

- *Cooperia pectinata\**
- *Cooperia punctata*
- *Cooperia spp*
- *Bunostomum phlebotomum\**
- *Strongylodes papillosus\**
- *Desopagostomum radiatum*
- *Trichuris spp\**

#### Nematódeos pulmonares (adultos e larvas de quarto estágio):

- *Dicytocalus viviparus*
- *Bernes:*
- *Dermatobia hominis*
- *Miases (bicheiras):*
- *Cochliomyia hominivorax*
- *Piolhos:*
- *Linognathus vituli*
- *Haematopinus eurysternus*
- *Solenopotes capillatus*
- *Ácaros da sarna:*
- *Psoroptes bovis*
- *Carrapatos:*
- *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*

Dectomax® também pode ser utilizado como auxiliar no controle de:

#### Piúho mastigador:

- *Damalinia bovis*

#### Mosca-dos-chifres:

- *Haematobia irritans*

4015673

### Dosagens:

#### Bovinos:

Aplicar Dectomax® pela via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectin por kg).

Utilize a tabela abaixo como referência:

Peso (Kg)	Dose (mL)	Peso (Kg)	Dose (mL)
até 50	1	301 - 350	7
51 - 100	2	351 - 400	8
101 - 150	3	401 - 450	9
151 - 200	4	451 - 500	10
201 - 250	5	501 - 550	11
251 - 300	6	551 - 600	12

#### Suínos:

Aplicar Dectomax® pela via intramuscular na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso (300 mcg de Doramectin por kg).

Utilize a tabela abaixo como referência:

Peso (Kg)	Dose (mL)	Peso (Kg)	Dose (mL)
até 33	1,0	67 a 82	2,5
34 - 50	1,5	83 a 99	3,0
51 - 66	2,0		

#### Ovinos:

Aplicar Dectomax® pela via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectin por kg) contra nematódeos gastrintestinais, miases (bicheiras) e berne (bicho da cabeça) e de 1 mL para cada 33 kg de peso (equivalente a 300 mcg de Doramectin por kg) contra ácaros da sarna.

### Administração:

#### Bovinos:

Dectomax® pode ser aplicado por via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectin por kg). Injetar o produto nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no músculo do pescoço (ver o desenho abaixo). Utilizar agulha de calibre 16 e comprimento de 15 a 20 mm.

4015673

Em ovinos tem ação contra nematódeos gastrintestinais, miases, bicho da cabeça e ácaros da sarna.

Baixo volume de injeção.

Baixa seringabilidade.

Fácil de aplicar.

### Segurança:

Ampla margem de segurança inclusive para animais de reprodução, vacas, porcas e ovelhas prenhes, e bezerros, leitões e cordeiros recém-nascidos.

### Compatibilidade:

Dectomax® não interfere com vacinações nas práticas de manejo veterinário.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação: Frasco ampola de vidro âmbar contendo 20, 50, 100, 200 e 500 mL.

Responsável Técnico: Renato B. Ferreira - CRMV-SP nº 1.695

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4055/92 em 14/08/92.

Proprietário: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701 - CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ nº 43.588.045/0001-31

Fabricante: Inovat Indústria Farmacêutica Ltda

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.555

CEP 07112-070 - Guarulhos - SP


CNPJ nº 27.864.378/0001-90 - Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919

4015673

### Suínos:

Dectomax® deve ser aplicado pela via intramuscular na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso (300 mcg de Doramectin por kg). Os animais deverão ser muito bem contidos para assegurar a aplicação da dosagem indicada. Usar equipamento estéril e seguir procedimentos de assepsia. Utilizar agulha de calibre 18 a 20 e comprimento de 35 mm.



### Ovinos:

Aplicar Dectomax® pela via intramuscular ou subcutânea na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectin por kg), contra nematódeos gastrintestinais, miases (bicheiras) e berne (bicho da cabeça) e de 1 mL para cada 33 kg de peso (equivalente a 300 mcg de Doramectin por kg) contra ácaros da sarna. Utilizar agulha de calibre 10 e comprimento 25 mm. Usar equipamento estéril e seguir procedimentos de assepsia.



### Vantagens do Produto:

Amplio espectro: Dectomax® possui amplo espectro de ação contra nematódeos gastrintestinais, vermes pulmonares, bernes, miases (bicheiras), piolhos, sarnas, carrapatos e como auxiliar no controle da população da mosca-dos-chifres dos bovinos. Em suínos tem ação contra nematódeos gastrintestinais, vermes pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna.