

TRIAZOCLIN®
SULFAMETAZINA + TRIMETOPRIM

USO VETERINÁRIO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Sulfametazina	40,0g
trimetoprim	8,0g
Veículo q.s.p.	10,0mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS:

"ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "28" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. "

"LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "3" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO O LEITE DEVE SER DESCARTADO. "

EQUINOS:

"PRODUTO NÃO INDICADO PARA ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. " A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO."

INDICAÇÕES:

TRIAZOCLIN é indicado nos casos de enfermidades sensíveis à Sulfadiazina e ao Trimetoprim, tais como: pneumonia, rinite, bronquite infecciosa, infecções secundárias às pneumonias por vírus, garrotinho, diarreias, vaginite, metrite, agalaxia bacteriana, como preventivo de infecções pós-parto e pós-operatório, cistite, uretrite, nefrite, mastite, poliartrite infecciosa, pododermatite e septicemias. **TRIAZOCLIN** atua nas principais bactérias, tais como: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Corynebacterium* spp., *Klebsiella* spp., *Haemophilus* spp., *Bordetella bronchiseptica* e *Fusobacterium necrophorum*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Administrar por via intramuscular profunda.

A dose diária recomendada é de 1mL para cada 30Kg de peso. Recomenda-se a continuação do tratamento por um período de até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas, não excedendo 5 dias consecutivos.

* Em infecções graves, a dose diária poderá ser aumentada para 1,5mL para cada 30Kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÃO DE USO:

Os animais tratados e destinados ao consumo humano deverão ser abatidos 28 dias após a última aplicação. O leite destinado ao consumo humano deverá ser utilizado 3 dias (72 horas) após a última aplicação. **TRIAZOCLIN** não deve ser administrado em equinos destinados ao consumo humano.

APRESENTAÇÕES:

Frasco contendo 15mL, 50mL e 100mL.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 1.267/57 em 22/01/1957.

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516

Venda sob prescrição e aplicação do Médico Veterinário

Proprietário:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 - Jaboticabal – SP

Fone/Fax: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

www.biofarm.com.br

SAT - Serviço de Atendimento Técnico

0800 702 3551

