

7,5 cm



J.A Saúde Animal

# Turbovit<sup>®</sup>

## B12

### USO VETERINÁRIO

Vitamina



#### FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Cianocobalamina (Vitamina B<sub>12</sub>) ..... 400.000 µg  
Veículo q.s.p. .... 100 mL

#### INDICAÇÕES

Prevenção e tratamento dos estados carenciais de Vitamina B<sub>12</sub> (Cianocobalamina).

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.*

#### MODO DE USO E DOSAGEM

O produto Turbovit<sup>®</sup> B12 deve ser administrado pelas vias intramuscular profunda ou intravenosa, uma vez ao dia, por até duas semanas a critério do Médico Veterinário, utilizando seringa e agulha estéreis e descartáveis. Procedimentos assépticos devem ser utilizados na aplicação.

O produto Turbovit<sup>®</sup> B12 deve ser administrado nas seguintes doses indicadas abaixo:

Bovinos e Equinos Adultos ..... 5,0 mL  
Bezerros, Potros, Ovinos, Caprinos e Suínos ..... 2,0 a 3,0 mL

#### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Respeitar às indicações e o modo de uso e dosagem do produto;  
Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia;  
Evite fumar ou alimentar-se durante o manuseio;  
Lavar as mãos após o manuseio do produto;  
Obedecer às condições de armazenamento do produto;  
Não guardar o produto próximo a alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal;  
Não lavar e reaproveitar as embalagens vazias. Destruí-las por incineração;  
O medicamento deve ser utilizado sob a orientação de um Médico Veterinário.

#### EFEITOS COLATERAIS

Não há evidência de efeitos adversos do excesso de Vitamina B<sub>12</sub> administrada por qualquer rota em qualquer espécie.

#### CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade à Vitamina B<sub>12</sub>;  
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido;  
Não administrar o produto por mais de duas semanas.

15 cm

7,5 cm



**J.A Saúde Animal**

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

O Cloranfenicol provoca antagonismo da ação antianêmica da Vitamina B<sub>12</sub>, pois retarda a maturação dos eritrócitos. Assim, deve-se evitar a administração conjunta destes fármacos.

Sua absorção intestinal é diminuída por aminoglicosídeos, ácido aminossalicílico, cloranfenicol, colchicina, anticonvulsivantes, preparados de liberação lenta de potássio e uso prolongado e excesso de álcool.

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar o produto até 12 meses após a primeira aplicação.

#### **"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"**

##### **BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS:**

**ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS.**

**LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE ANIMAIS TRATADOS.**

##### **SUÍNOS:**

**ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS.**

15 cm

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 169/2018 em 15/08/2018.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú  
CRMV-SP 1.938

#### **APRESENTAÇÃO**

Frasco-ampola contendo 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL e 100 mL do produto.



**JA Saúde Animal**

170\_07

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**  
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000  
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920



Indústria Brasileira

CNPJ: 03.749.465/0001-38  
[www.jasaudeanimal.com.br](http://www.jasaudeanimal.com.br)



SAC 0800 774 4334