



Solução injetável de ocitocina USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Ocitocina sintética 1.000 UI
Veículo q.s.p. 100 mL

INTRODUÇÃO:

A ocitocina endógena é produzida no núcleo supra-óptico do hipotálamo e, armazenada e liberada pela neuro-hipófise. **OCITOVET** é composto de um hormônio sintético fisiológico e quimicamente semelhante ao hormônio natural, possuindo portanto, as mesmas atuações no organismo animal.

A ocitocina promove a contração da musculatura uterina, vascular e de outros músculos lisos, regula a contratilidade das células mioepiteliais ao redor dos alvéolos da glândula mamária, auxilia na descida do leite no momento da ordenha e favorece a involução uterina pós-parto e na retenção de placenta para a expulsão de secundinas e exsudatos.

INDICAÇÕES:

OCITOVET é indicada para bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos, nos casos de:

PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS:

- Indução ou aceleração do parto;
- Estimula a motilidade da musculatura uterina durante o parto, sendo um fator de grande importância na expulsão do feto e da placenta;
- Nos casos de retenção de placenta e atonia uterina;
- Coadjuvante no tratamento de piometrites e endometrites para provocar a expulsão de exsudatos.
- Promoção da involução uterina após cesarianas;

- No início da lactação após o parto;
- Coadjuvante nas síndromes MMA (Metrites - Mastites - Agalaxia);
- PROMOÇÃO DA DESCIDA DO LEITE:**
- Atuação nas células mioepiteliais da glândula mamária favorecendo a ejeção do leite no pós-parto ou momento da ordenha;
- Coadjuvante nos casos de agalaxia;

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USAR E POSOLOGIA:

OCITOVET pode ser aplicado pelas vias subcutânea ou intramuscular, respeitando as normas básicas de assepsia.

A quantidade de **OCITOVET** preconizada, em mL depende da espécie animal, da via de administração e da indicação, como indicam os quadros a seguir:

PARA USO OBSTÉTRICO:

Espécies	Unidades USP	Volume (ml) - via SC, IM e IV
Bovinos	75 - 100	7,5 - 10
Equinos	75 - 150	7,5 - 15
Suínos	30 - 50	3 - 5
Ovinos	30 - 50	3 - 5
Caprinos	30 - 50	3 - 5

PARA A DESCIDA DO LEITE:

Espécies	Unidades USP	Volume (ml) - via SC, IM e IV
Bovinos	10 - 20	1 - 2
Equinos	10 - 20	1 - 2
Suínos	5 - 20	0,5 - 2
Ovinos	5 - 20	0,5 - 2
Caprinos	5 - 20	0,5 - 2

Quando possível, o gotejamento lento intravenoso com soro glicosado ou salino é preferido para facilitar o trabalho de parto, apresentando efeito imediato com duração de cerca de 10 (dez) minutos. Nas aplicações intramusculares ou subcutâneas o efeito inicia-se dentro de 6 a 10 minutos. A ocitocina não apresenta efeito cumulativo, portanto a dosagem pode ser repetida sem qualquer risco.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Para qualquer via recomenda-se baixa dose inicial e se necessário a repetição da dose em intervalos de 20 a 30 minutos.

Manter os animais calmos antes, durante e depois a aplicação de ocitocina para obter um efeito completo da ocitocina.

Não associar ocitocina com vasoconstrictores simpatomiméticos ou corticóides.

O uso concomitante com estrógenos ou cálcio aumenta o efeito da ocitocina.

CONTRA INDICAÇÕES:

Não utilizar em fêmeas em gestação até o momento do parto.

O produto não deve ser aplicado quando da constatação de parto distócico devido à incorreta apresentação fetal até a correção mediante manipulação obstétrica, desproporção céfalo-pélvica, qualquer obstrução mecânica ou quando não houver dilatação do colo uterino durante o parto.

Não aplicar em fêmeas com predisposição à ruptura uterina ou animais que apresentem enfermidades cardíovasculares.

SOBREDOSAGEM:

Dosagens excessivas poderão originar hiperestimulação do miométrio, liberação prematura da placenta do útero, bradicardias e arritmias cardíacas, hemorragias pós-parto, contração tetânica do útero, aumento da injúria fetal podendo causar a morte do feto pela compressão uterina, ruptura do útero e até morte da mãe.

Pode ocorrer intoxicação do animal por retenção de água, caracterizada por convulsões, coma e até morte, devido à administração de grandes doses de ocitocina repetidamente por longos períodos.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Administrar com precaução em fêmeas que apresentem quadro de toxemia.

Aplicar o produto em perfeitas condições de assepsia.

Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

A higiene é fundamental; sempre lavar as mãos antes e depois de manusear qualquer produto veterinário. Não reutilizar as embalagens vazias.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE CAPRINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS CAPRINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE OVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS OVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE EQUINOS TRATADOS.

"A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO".

APRESENTAÇÕES:

Display com 10 frascos contendo 1mL; Display com 24 frascos contendo 5mL, 10mL e 50mL; Display com 25 frascos contendo 50mL; Display com 30 frascos contendo 50mL.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO
MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O
PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO,
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA
E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO VETERINÁRIO

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Responsável Técnico:

Dr. Cassio R. Murin CRMV-SP 6.473

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.970 em 28/09/2004.

Proprietário: Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - CEP: 13148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05 - SAC: 0800 770 0355

E-mail: cevabrasil@ceva.com

Fabricante: Vetecia Laboratórios de Produtos Veterinários Ltda-EPP.
R. Dr. Alfredo Ramos, 236 - Centro - Jacareí - CEP: 12308-420
CNPJ: 07.685.131/0001-07 - Indústria Brasileira

P10199 V06

